

DERMATOSIS PUSTULOSA SUBCORNEAL DE SNEDDON Y WILKINSON

SUBCORNEAL PUSTULAR DERMATOSIS (SNEDDON-WILKINSON DISEASE)

Pablo C. Osorio R*, Carlos Batista†

*Estudiante de XI Semestre; Facultad de Medicina, Universidad de Panamá.

†Estudiante de IX Semestre, Facultad de Medicina, Universidad de Panamá.
Hospital Santo Tomás.



Paciente masculino de 23 años procedente de Arraiján, con antecedentes de dermatosis disseminada de siete años de evolución, constituida por vesículas y ampollas que confluyen formando placas arciformes con escamas y costras. Ha cursado con períodos de remisión y exacerbación sin presentar mejoría absoluta de su condición. Se le diagnostica *dermatosis pustulosa subcorneal*. Fue manejado ambulatoriamente con diprospán IM, dapsona 200 mg vo, corticoides tópicos y dicloxacilina.

La *dermatosis pustulosa subcorneal de Sneddon y Wilkinson* se presenta con brotes de pústulas o ampollas de contenido seroso turbio, subcorneales, afectando todo el tronco y grandes pliegues, disponiéndose en placas circinadas. El proceso evoluciona con brotes recidivantes, respondiendo parcialmente al tratamiento. Como dermatosis ampollosa esencial, su diagnóstico diferencial es el pénfigo.

